



Paramètre	Préparation du patient et renseignement clinique	Moment de prélèvement	Délai
Activité anti Xa	petit déjeuner léger sans matières grasses	si HNF IV: à tout moment à partir de la 6e h de traitement; si HNF SC: à mi-distance entre deux injections; si HBPM: 2 inj/j en curatif = pvmt à 3-4h après inj; si HBPM 1inj/j en curatif => pvmt 4-6h après inj	J0
Bilharziose urinaire	hématurie, voyage	Le matin au réveil	J0
BNP	urgence	Toute heure	J0
Cathéter & Matériel inerte : Vis, électrodes, stérilet, Sonde urinaire	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J4
Cholestérol	à jeun de 10 à 12H	Toute heure	J0
Coproculture	voyage, traitement en cours, manifestation clinique, med travail	Toute heure	J2-J4
Coproculture enfant (< 3ans) (avec Adéno /Rotavirus).	voyage, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J2-J4
Cortisol	à prélever avant 10h du matin ou après 16h, en fonction de la demande	A prélever avant 10 heures du matin ou après 16h	J0
Culot urinaire	grossesse, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J0
Culot urinaire (recueil)	grossesse, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J0
D Dimères	petit déjeuner léger sans matières grasses	Toute heure	J0
ECBU	grossesse, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure miction (>2 hrs après miction)	J1-J3
ECBU (recueil)	grossesse, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure miction (>2 hrs après miction)	J1-J3
Estradiol	indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement hormonal	Toute heure	J0
Examen parasitologique des selles	voyage, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J2
Fer	les taux de fer sérique peuvent présenter une variation diurne de 30%, avec un pic de concentration tôt le matin	Toute heure	J0
Fibrinogène	petit déjeuner léger sans matières grasses	Toute heure	J0
FSH	indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement hormonal	Toute heure	J0
GAZ DU SANG	préciser température, oxygène ou non	Toute heure	immédiat
Glucose, glycémie	à jeun de 10 à 12 h Sauf test de charge ou post prandiale	Test de charge: prélèvements à 1h et/ou 2h et/ou 3 h selon le protocole appliqué En post-prandial 2 H après le repas	J0
HDL	à jeun de 10 à 12H	Toute heure	J0
Hémoculture	traitement en cours, manifestation clinique, fièvre	Toute heure au moment d'un pic de température ou frissons	J2-7
Héparinémie	petit déjeuner léger sans matière grasse	si HNF IV: NA, à partir de la 6e h de traitement; si HNF SC: à mi distance entre deux injections	J0
HLM (Hématies Leucocytes Minute)	heures de début et de fin de recueil	3 h avant son lever : vider la vessie, boire 1/4 litre d'eau et se recoucher. Recueillir la totalité des urines 3 h après.	J0
LH	indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement hormonal	Toute heure	J0
Liquide de Ponction : articulaire, péricardique et ascite	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J4
Liquide de redon & drainage	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J4
Mycologie avec recherche de dermatophytes	traitement en cours	Toute heure	J10-J28
Mycoplasme (Col urètre)	grossesse, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure miction (>2 hrs après miction)	J2-J4
Mycoplasme (sperme ou urines)	grossesse, traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure miction (>2 hrs après miction)	J2-J4
Prélèvement origine respiratoire : Expectoration, Aspiration bronchique	traitement en cours, manifestation clinique	Le matin au réveil	J4
Progestérone	indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement hormonal	Toute heure	J0
Prolactine	indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement hormonal. Repos un quart d'heure.	Toute heure	J0
Protéines urinaires et LCR	éviter le recueil des urines de 24H après un exercice physique qui augmente l'excrétion des protéines.	Toute heure	J0
PV, PU, ORL, Plaie	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J4
RAI	préciser transfusion antérieure, injection anti D	Toute heure	J0
Recherche de Clostridium difficile (antigène + Toxines)	traitement antibiotique, manifestation clinique	Toute heure	J0
Recherche de Demodex	conjonctivite	Toute heure	J0
Recherche de gale	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J0
Recherche de Malassezia furfur	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J0-J10
Recherche de paludisme	si possible au pic thermique et recueil de renseignements cliniques (température, voyage, traitement ...)	Au pic thermique si possible et avant tout traitement curatif	J0
Recherche de sang dans les selles	éviter les AINS, la vitamine C et le fer; en dehors des périodes de règles ou en présence d'hémorroïdes	Toute heure	J2
Scotch test anal	N/A	Le matin au réveil	J0
Spermoculture	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure après toilette locale et recueil par masturbation	J2-J4
β-hCG	indiquer la date des dernières règles	Toute heure	J0
TCA : Temps de Céphaline activé	petit déjeuner léger sans matières grasses	Toute heure	J0
Temps de Saignement Ivy ou Duke	pas de traitement anticoagulant ou anti agrégant plaquettaire; plq > 50 000	Toute heure	J0



Tissus mous	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure	J4
Toxoplasmose IgM	N/A	Toute heure Suivi mensuel chez la femme enceinte sero négative	J0
TP : Taux de Prothrombine	petit déjeuner léger sans matières grasses	Toute heure	J0
Triglycérides	à jeun de 10 à 12H	Toute heure	J0
Troponine	urgence	Toute heure	J0
Urines 1er jet	traitement en cours, manifestation clinique	Toute heure (>2 hrs après miction)	J2-J4